Parken[®]

Carbidopa 25mg Levodopa 250mg

Vía oral

Tabletas

Composición

Cada tableta contiene Carbidopa 25 mg y Levodopa 250 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, povidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, talco, color azul N° 2, alcohol etílico, agua.

Acción terapéutica

La carbidopa inhibe la decarboxilación de los aminoácidos aromáticos, con acción limitada a los tejidos periféricos. La levodopa es un aminoácido aromático, que a diferencia de la dopamina, cruza la barrera hematoencefálica, convirtiéndose a dopamina en los ganglios basales. La evidencia actual indica que los síntomas de la enfermedad de Parkinson se relacionan con la depleción de dopamina en el cuerpo estriado.

Indicaciones

Tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

Posología

Iniciar dosis equivalente a 1 tableta 3 veces al día. Añadir $\frac{1}{2}$ -1 tableta cada 1-2 días.

Contraindicaciones y Advertencias

Desórdenes psicóticos severos, glaucoma, embarazo y lactancia. Precaución en pacientes con daño cardiovascular, endocrino, hepático, pulmonar o renal, o con historia de úlcera gastroduodenal. En pacientes que reciben levodopa ajustar la dosis dejando un intervalo de 12-24 horas, iniciando con una dosis equivalente al 20% de la anterior. Contraindicado en pacientes con feocromocitoma, con síndrome neuroléptico maligno, rabdomiólisis y en glaucoma del ángulo cerrado.

Debe utilizarse con precaución en pacientes psicóticos. Se recomienda control permanente del especialista.

Reacciones adversas

Movimientos coreiformes, distónicos, contracciones musculares y blefarospasmos; paranoia, episodios psicóticos, depresión, tendencia suicida, demencia, convulsión y náuseas. Otros: Palpitación, hipotensión ortostática, bradicinesia, anorexia, vómito, mareo, hemorragia gastrointestinal, úlcera duodenal, hipertensión, flebitis, anemia hemolítica y no hemolítica, trombocitopenia, agranulocitosis. Cambios en transaminasas séricas, fosfatasa alcalina, DHL, bilirrubina, nitrógeno ureico, yodo proteico y prueba de Coombs. Interacciones con antihipertensivos, antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, butirofenonas, difenilhidantoína, papaverina y dieta rica en proteínas.

Presentación

Parken 25/250: Caja por 30 y 60 Tabletas.

Producto de uso delicado, adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.

Venta baio receta médica.

Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Consérvese a temperatura no mayor a 30°C.

Elaborado por Laboratorios Siegfried S.A.S.

Bogotá, D.C.- Colombia.

Importado y Distribuido por **Laboratorios Siegfried S.A.** Quito - Ecuador

